




МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
МК - сп. “помощник фармацевт”
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Лекция №5

Кръвообращение.



Устройство на съдовата система. Налягане в
съдовата система. Регулация на съдовия тонус.
Регулация на артериалното налягане.

Микроциркулация.
Налягане и движение
на кръвта във вените



ДОЦ. Д-Р Б. РУСЕВА, Д.М.
СЕКТОР “ФИЗИОЛОГИЯ”
МУ-ПЛЕВЕН

Кръвообращение




Разпределение на кръвта в системното кръвообращение



- сърце - 5%;
- гл. мозък - 15% ;
- мускули - 20%;
- бъбреци - 20%
- спланхникус - 25%;
- кожа - 15%

Устройство на съдовата стена



Класификация на кръвоносните съдове



1. В зависимост от функциите:

- Модериращи (аорта и големи артерии)
- Съпротивителни (артериоли)
- Обменни (капиляри, венули)
- Капацитивни (вени)

2. В зависимост от налягането:

- Система на ниско АН
- Система на високо АН

Движение на кръвта в артериалната система



- Фактори, които придвижват кръвта в артериалната система:
 1. Сърдечната систола
 2. Еластичните сили в аортата и артериите по време на сърдечната диастола
- Линейна скорост на кръвния поток
- Аорта = 120 cm/s по време на систола и 40 cm/s по време на диастола
- Артерии от 60 до 15 cm/s по време на систола и по-ниска по време на диастола
- Капиляри = 0,5 mm/s
- *Линейната скорост е обратно пропорционална на общото сечение на съдовата област.*

Кръвоносна система




Напречно сечение на съдовите области (cm²)

- аорта = 2.5
- малки артерии = 20
- артериоли = 40
- капиляри = 2500
- венули = 250
- малки вени = 80
- Venaе cavae = 8

Обемна скорост на кръвния ток – обемът кръв, който преминава за единица време през дадена съдова област.

- Еднаква за различните съдови области!!!
- Тя е функция от тоталното напречно съдово сечение и линейната скорост на кръвта.

Aorta



Хемодинамични закономерности

- $Q = \Delta P / R$
- $\Delta P = Q \cdot R$
- $R = 8l\eta / \pi r^4$
- $Q = \Delta P \cdot \pi r^4 / 8l\eta$
- $\Delta P = Q \cdot 8l\eta / \pi r^4$

P - налягане

Q – количество кръв (МОС)

l – дължина на съд. с-ма

η - вискозитет на кръвта

R – радиус на съда

Артериално кръвно налягане (АН)

- **Систоллично АН у възрастен при покой: 100 - 140 mmHg**

Зависи от МОС (5,25 l/min)

$$\text{МОС} = \text{УО} \times \text{СЧ}$$

- УО зависи от:

- диастоличното пълнене
- еластичността на артериалните съдове
- миокардния контрактилитет

- СЧ зависи от:

- симпатиковия тонус

Артериално кръвно налягане (АН)




- **Диастолично АН** у възрастен при покой:
60-90 mmHg


Зависи от: периферното съпротивление

- Пулсово налягане = СН – ДН
- Средно артериално налягане – интеграл от моментните стойности на налягането, измерени по време на сърдечния цикъл, разделен на продължителността на сърдечния цикъл. То е по-близко по стойност до ДН, защото диастолата е по-дълга от систолата.
- $САН = ДН + 1/3 ПН$

Запис на артериалното налягане




Промени в САН в различните съдови области




САН стръмно спада в областта на артериолите поради повишено съдово съпротивление.

Ефект на гравитацията върху АН



Легнало положение



Изправено положение

Съдов тонус



- **Локален контрол**
 1. Миогенна регулация
 2. Локални хуморални фактори: CO_2 , H^+ , O_2 , аденозин, лактат
 3. Ендотелен контрол: NO ; ендотелини

Функции на ендотела



- Обвива съдовете отвътре
- Секретира вещества, регулиращи съдовия тонус
- Секретира вещества, регулиращи съдовия растеж
- Участва в регулацията на кръвосъсирването
- Регулира транспортните процеси през съдовата стена

Ендотелен контрол на съдовия тонус



- **NO** се произвежда от АК **L-arginine** под действието на ендотелната азотно-оксидна синтаза (eNOS).
- Активността на eNOS е калций - калмодулин зависима.
- Има 2 основни механизма за стимулация на eNOS, които участват в отделянето на калциеви йони от ендоплазмения ретикулум:
 1. повишен кръвен поток (**синтез на NO, зависеща от кръвния поток**).
 2. свързване на ендотелни рецептоти с различни лиганди като ацетилхолин, брадикинин, субстанция-Р, аденозин и други вазоактивни вещества (**рецептор-стимулирана синтеза на NO**).

Нобеловата награда за Физиология и медицина за 1998 год. е присъдена на Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro and Ferid Murad за тяхната научна работа, разкриваща ролята на азотния оксид като сигнална молекула в сърдечно-съдовата система.


● **Ефекти на NO:**

- директна вазодилатация
- индиректна вазодилатация чрез инхибиране вазоконстрикторния ефект на ангиотензин II и симпатикуса
- анти - тромботичен ефект- инхибира адхезията на тромбоцитите към ендотела
- противо-възпалителен ефект- инхибира адхезията на левкоцити към ендотела
- анти-пролиферативен ефект – инхибира хиперплазията на гладкомускулните клетки

Съдов тонус – ендотелен контрол



- **Ендотелини** → мощен вазоконстрикторен ефект
- Те са пептиди, съдържащи 21-амино киселини, продуцирани от ендотелните клетки.



Съдов тонус



- **Хуморален контрол**
- ◆ **вазодилатори:** брадикинин, хистамин, простагландини, АТФ, атриален натриуретичен пептид;
- ◆ **вазоконстриктори:** адреналин, норадреналин, ангиотензин II, вазопресин, серотонин.

Съдов тонус



- **Нервен контрол:**
 1. Симпатикусът изпраща тонични импулси с честота 1-3/s в покой.
 2. Парасимпатикусът осъществява вазодилатация само в 3 съдови области: *ria mater*, слюнни жлези и външни гениталии.

Регулация на артериалното налягане




- Системата за регулация на АН работи на принципа на отрицателната обратна връзка.
- Регулируема величина е САН, поради това АН е вариабилна величина.
- Променя се МОС (работата на сърцето) и периферното съпротивление (съдовия тонус) за връщане към нормата при нарушения извън нормалните граници за възрастта.

Бърза регулация на АН



- ❑ **Включва се веднага след отклонение на АН**
- ❑ **Медуларният сърдечно-съдов център (ССЦ) има една срединно разположена депресорна зона и две периферни пресорни зони.**
- ❖ **Барорецепторен рефлекс** - при повишение на АН се възбуждат барорецептори в стената на аортата и общата сънна артерия (в аортното и каротидното телце); сигналите се предават по сетивни нерви до депресорната зона на медуларния ССЦ; активира се ПС дял на ВНС в резултат на което се намалява МОС и периферното съпротивление.
- ❖ **Хеморецепторен рефлекс** – при понижение на АН поради преминаване на по-малък поток кръв, респективно кислород през аортата и каротидната артерия се възбуждат хеморецептори; сигналите се предават по сетивни нерви до пресорните зони на медуларния ССЦ; активира се С дял на ВНС в резултат на което се повишава МОС и периферното съпротивление.
- ❖ **Исхемичен отговор на ЦНС** – проявява се тогава когато САН спадне под 50 mmHg.

Бърза регулация на на АН – барорецепторен и хеморецепторен рефлекс



Нервен контрол на АН



До медуларния ССЦ достигат влияния от кората, хипоталамуса и лимбичната с-ма, които повлияват активността му.


Дълготрайна регулация на АН



❑ **Осъществява се чрез действието на хормони:**

- Вазопресин (АДХ)
- Системата ренин → ангиотензин → алдостерон
- Атриален натриуретичен пептид

Микроциркулаторна единица



артериола:

$XH = +32 \text{ mmHg}$

$KOH = -25 \text{ mmHg}$

филтрация $\Phi H = +7 \text{ mmHg}$




венула:

$XH = +15 \text{ mmHg}$

$KOH = -25 \text{ mmHg}$

резорбция $\Phi H = -10 \text{ mmHg}$



Функции на вените




- 1. кръвен резервоар
- 2. връщат кръвта към сърцето

Механизми, които подпомагат движението на кръвта във вените:



1.Наличие на венозни клапи



Механизми, които подпомагат движението на кръвта във вените:



2. съкращенията на мускулите на долните крайници
3. съкращението на *lig. inguinalae* при движения
4. съкращенията на диафрагмата при вдишване

Венозно налягане (ВН)



1. В легнало положение ВН е 5 mm Hg по-ниско от налягането в капилярите

2. В изправено положение:

- ВН на ръцете = +6 , + 8 mm Hg
- ВН на краката = +40, + 90 mm Hg
- **ЦВН** = от +2 до +6 mm Hg
(обикновено е +4 mm Hg)