

СТАНОВИЩЕ

От доц. Д-р Снежана Мургова, дм

Началник клиника „Очни болести“ УМБАЛ д-р Г. Странски гр. Плевен

Относно дисертационния труд **„ОБСТРУКЦИЯ НА
НАЗОЛАКРИМАЛНИЯ КАНАЛ- ПОВЕДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ“**

За получаване на образователна и научна степен **„Доктор“** по научна
специалност **Офталмология.**

Дисертант: **д-р Красина Пеева Вълчева**

Катедра „Очни болести, УНГ болести, лицево- челюстна хирургия с ХС“

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА ДИСЕРТАНТА

Д-р Красина Вълчева е родена през 1987 г. в гр. Плевен. Завършва средно образование в математическа гимназия „Гео Милев“ в гр. Плевен. През 2012 г. завършва медицина в МУ – Плевен. От 2014 г. е зачислена като редовен докторант към катедра „Очни болести, УНГ болести, лицево- челюстна хирургия с ХС“.

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Детска офталмология 2018 г.

Съвременни методи за диагностика на първична откритоъгълна глаукома – 2018 г.

Ангиография, ОСТ, клинични корелации – 2017 г.

Лечение на диабетната ретинопатия – 2017 г.

Moorfields Eye Hospital, London – 2018 г.

НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ

Д-р Вълчева има общо 10 публикации и научни съобщения свързани с дисертационния труд в специализирани научни форуми и издания у нас и в чужбина.

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА

Обструкцията на назолакрималния канал е често срещано състояние при деца . Изявява се клинично в първите месеци след раждането, свързано е с някои рискови фактори и може да се съпътства от анизометропична амблиопия. В България няма проучване за обструкцията на слъзния канал при деца и за резултатите от приложеното лечение.

Дакриоцисториностомията е процедура с висока успеваемост и може да се извърши както по външен, така и по ендоскопска методика. По литературни данни успеваемостта и при двете техники е сходна, но за втората е необходима специфична и скъпоструваща апаратура.

В този аспект темата на дисертационния труд е актуална и значима.

Докторантката разглежда този проблем като прави разширен литературен обзор, за да определи **целта** на дисертационния труд: Оценка на терапевтичния подход при пациенти с конгенитална и придобита обструкция на назолакрималния канал.

За постигане на тази цел са поставени 8 **задачи**:

1. Да се анализира оперативната техника на сондиране при пациенти с КОНК.
2. Да се определи успеваемостта на сондирането.
3. Да се проучи зависимостта между възрастта на децата към момента на сондирането и ефекта от процедурата.
4. Да се оцени резултатът от консервативния метод на лечение с масаж по метода на Криглер при пациенти с КОНК.
5. Да се проучи връзката между КОНК и наличието на рефракционна аномалия в засегнатото око/ очи
6. Да се определят рисковите фактори за развитие на КОНК
7. Да се анализира оперативната техника на външна ДЦРС при пациенти с ППОНК.
8. Да се проучи успеваемостта на външната ДЦРС.

СТРУКТУРИРАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационния труд е написан на български език на 158 страници със следната структура: въведение, литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи и приноси. Онагледен е с 11 таблици, 97 фигури и 3 приложения. Библиографията включва 255 литературни източника, от които 9 са на кирилица 246 на латиница.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проведено е ретроспективно клинично проучване на 219 деца и проспективно проучване 131 деца с конгенитална обструкция на слъзния канал. Анализирани са ретроспективно 30 очи с придобита обструкция на назолакрималния канал.

Използваната хирургична методика е описана подробно - за конгениталната и за придобитата обструкция на сл. пътища.

Статистическата обработка на данните е извършена с MS Excel, Statgraphics Software 2.0.0.0 и MedCalc. Използвани са: дескриптивен анализ, тест на Фишер, тест на Ман и Уитни и др.

СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ

След задълбочен анализ на собствените резултати и съпоставянето им с наличните данни на автори от цял свят, представени в литературния обзор, авторката прави 7 **извода**:

1. Сондирането на слъзните пътища при КОНК е високоефективна оперативна процедура, която не крие риск от сериозни интраоперативни усложнения.
2. Успеваемостта на сондирането при КОНК не се определя от възрастта на детето към момента на манипулацията, а от вида на обструкцията.
3. Консервативното лечение на КОНК с масаж по метода на Криглер е с висока успеваемост при деца до 12 месечна възраст.
4. Рисков фактор за появата на КОНК е приемът на антибиотици от майката по време на бременността.
5. КОНК не оказва влияние върху развитието на рефракцията на засегнатото око/ очи.
6. Външната ДЦРС е ефективно лечение на ППОНК, което не крие риск от сериозни интра- и постоперативни усложнения.
7. Козметичният и функционален резултат след външна ДЦРС удовлетворява пациентите.

Заключение: Представеният дисертационен труд е завършен, включва приноси с клинично-приложен характер и отговаря на Правилника за развитие на академичния състав на МУ- Плевен. Давам положително становище и предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват в подкрепа на присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност офталмология на д-р Красина Вълчева.

30.12.2019 г.



Доц. Снежана Мургова, дм