


# НАУКА Кардиология




1

7

16

15



14

9

10

4

101

АРТЕРИАЛНА  
ХИПЕРТОНИЯ

117

ПСОРИАЗИС  
И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ  
РИСК

125

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ

3

2012

ГОДИНА XIII  
ISSN 1311-459X

## Дислипидемии при пациенти с Psoriasis vulgaris

Доц. Снежана Тишева,<sup>1</sup> г-р Димитър Господинов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен

<sup>2</sup>Клиника по дерматология и Венерология, Медицински университет, Плевен

### Резюме

Направено е проучване сред 103 болни с тежка форма на Psoriasis vulgaris и 101 контроли. Изследвани са нивата на общия холестерол, триглицеридите, HDL-холестерола, отношението общ холестерол/HDL, атерогенна дислипидемия, срока на установяване на дислипидемиите, вида на лечението. Установява се висока честота на дислипидемиите и хипертриглицеридемиите спрямо контроли, както и ниско ниво на контрол на дислипидемиите. (Наука Кардиология, 2012, 73(3), 117–124)

**Ключови думи:** холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, дислипидемия, псориазис.

### Summary

A survey was made among 103 patients with severe type of Psoriasis vulgaris and 101 controls. The levels of total cholesterol, 3-glycerides, HDL-cholesterol, the relation total cholesterol/HDL, arteriogen dyslipidemia, the term for dyslipidemia statement and the type of treatment were studied. High frequency of dyslipidemia and hyper-3-glycerides was stated in comparison with the controls, as well as low level of dyslipidemia control. (Science Cardiology, 2012, 73(3), 117–124)

**Key words:** cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, dyslipidemia, psoriasis.

Псориазисът е хронично възпалително заболяване на кожата, опосредствано от имунната система, свързано с повишен сърдечно-съдов рисков профил. То се поражда и поддържа от различни възпалителни посредници (медиатори), които са компоненти на вродения и придобития имунитет.

Според големи популационни проучвания класическите големи сърдечно-съдови рискови фактори, като тютюнопушене, дислипидемия, артериална хипертония, диабет и затлъстяване, често са по-разпространени сред псориазиците и косвено влошават профила на сърдечно-съдовия риск, а същевременно стимулират активността на кожата заболяване.<sup>1–4</sup> Други автори съобщават, че няма разлика в честотата на рисковите фактори за атеросклероза сред псориазици и контроли.<sup>5</sup> Това ни мотивира да организираме първото българско

проучване по типа случай–контрол сред пациенти с тежка форма на Psoriasis vulgaris.

### Цел

Да се анализира честотата и тежестта на дислипидемиите при пациенти с различни форми на Psoriasis vulgaris в Плевенска област и да се сравнят с тези в контролната група.

### Клиничен контингент

Проведено е проучване от типа „случай–контрол“ или тип „кохортно“ на следните групи:

I. Пациенти с умерена и тежка форма на псориазис, които имат нужда от системна терапия (n=103).

II. Контролна група, сравнима по пол и възраст, без псориазис (n=101).